

基礎解析・最低限基礎事項 (基本プリント)

〈三角関数〉

- (1) 三角関数の定義を言え.
- (2) 角 $\theta = \boxed{\quad}$. $180^\circ = \boxed{\quad}$.
- (3) $\cos \theta$, $\sin \theta$ の値の範囲は?
- (4) $\cos \theta$, $\sin \theta$ の関係は?
- (5) $\cos \theta$, $\tan \theta$ の関係は?
- (6) 加法定理を言え.
- (7) (CM 5) をかけ.
- (8) 2倍角の公式をかけ.
- (9) 半角の公式をかけ.
- (10) 3倍角の公式をかけ.
- (11) $\tan \theta = t$ のとき, $\cos 2\theta$, $\sin 2\theta$ は?
- (12) 单振動の合成とは?
- (13) 2乗は $\boxed{\quad}$ · 積は $\boxed{\quad}$.
- (14) 三角関数の置換+変域について言え.
- (15) $y = \sin x$ のグラフをかけ.
- (16) $y = \cos x$ のグラフをかけ.
- (17) $y = \tan x$ のグラフをかけ.
- (18) ド・モアブルの定理をかけ.
- (19) $x^n = 1$ の解法は?

〈指数・対数関数〉

- (20) n 乗根 $\sqrt[n]{a}$ の定義は?
- (21) $a^x = \boxed{\quad}$, $a^0 = \boxed{\quad}$, $a^{-1} = \boxed{\quad}$, $a^{\frac{1}{n}} = \boxed{\quad}$
- (22) 対数の定義を言え.
- (23) 定義は $\boxed{\quad}$ と同値である.
- (24) 指数法則を 4 つかけ.
- (25) 対数法則を 4 つかけ.
- (26) $\log_a 1 = \boxed{\quad}$, $\log_a a = \boxed{\quad}$
- (27) 対数計算のPointsを言え.
- (28) $y = a^x$ のグラフをかけ.
- (29) $y = \log_a x$ のグラフをかけ.
- (30) 指数・対数の置換+変域を言え.
- (31) 対数方程式・不等式の解法は?

〈数列〉

- (32) (CM 11) を言え.
- (33) 等差数列の定義式は?
- (34) 等差数列の一般項は?
- (35) 等差数列の和とその求め方は?
- (36) 等比数列の定義式は?
- (37) 等比数列の一般項は?
- (38) 等比数列の和とその求め方は?
- (39) 双対性について述べよ.
- (40) まないたのテクニックとは?
- (41) Σ 一公式を 4 つかけ.
- (42) Σ 一公式の証明方法は?
- (43) $S_n = \sum a_k$ の求め方を 4 ついえ.
- (44) 差に直す方法をいえ.
- (45) 和 S_n から一般項 a_n の求め方をいえ.
- (46) 積 P_n から一般項 a_n の求め方をいえ.
- (47) 減化式(I型)とその解法は?
- (48) 減化式(II型)とその解法は?
- (49) 減化式(III型)とその解法は?
- (50) 減化式(IV型)とその解法は?
- (51) 減化式(V型)とその解法は?
- (52) 群数列のPointsを 3 つ述べよ.
- (53) $\underbrace{a a \dots \dots \dots a}_n = \boxed{\quad}$
- (54) 数学的帰納法による証明のスタイルを述べよ.

〈微分法〉

- (55) (CM 18) をかけ.
- (56) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ の定義を言え.
- (57) limit の計算方法は?
- (58) $y = f(x)$ の導関数の定義は?
- (59) $f(x)$ の図形的意味は?
- (60) 微分法の公式を言え.
 - 1. 定数 2. べき乗 3. 線形性 4. 積 5. 合成
- (61) 接線の方程式(文と式)をかけ.

- (62) 法線の定義と方程式をかけ.
- (63) $y=f(x)$ が単調増加(単調減少)とは?
- (64) 極大値(極小値)の定義を言え.
- (65) 変曲点の定義を言え.
- (66) $y=f(x)$ のグラフの書き方を言え.
- (67) 3次関数のグラフは の3種類のみ.
- (68) 4次関数のグラフは の4種類のみ.
- (69) 因数分解できる関数のグラフの簡単な書き方を述べよ.

例. $y = -x^2(x+2)^3(x-1)$


- (70) 方程式・因数分解・グラフの基本的な同値変形をかけ.
- (71) 不等式・最小値・グラフの基本的な同値変形をかけ.
- (72) (C M24) 最大・最小問題の4Pointsを述べよ.

〈積分法〉

- (73) 不定積分の定義を言え.
- (74) 定積分の定義を言え.
- (75) 定積分の図形的意味を言え.
- 面積 = , 体積 =
- (76) 偶関数・奇関数の積分について言え.
- (77) 絶対値のついた関数の積分の方法は?
- (78) $\int_a^{g(x)} f(t) dt$ を x で微分すると
- (79) 整関数 $f(x)$ を求める問い合わせの分類と解法(I)~(V)を言え.
- (80) 面積の公式を言え.
- (81) 面積計算の手順を示せ.
- (82) 特殊Typeの図形の面積の求め方
①~⑤について述べよ.
- (83) $\int_a^\beta (x-a)(x-\beta) dx = \boxed{}$
また、これを導け.
- (84) $\int_a^\beta (x-a)^p (x-\beta)^q dx = \boxed{}$

- (85) 体積の公式を言え.
- (86) 複雑な立体の体積の求め方を言え.

(例)



〈物理量と微分・積分〉

- (87) 直線上を動く動点 P の物理量

P の位置: $x=x(t)$ のとき

1. 速度 $v(t)=\boxed{}$, 加速度 $a(t)=\boxed{}$

2. $t=a$ から $t=b$ までの

変位: $x(b)-x(a)=\boxed{}$

道のり: $s=\boxed{}$


毎日10分の努力が合格への近道!

基礎解析基本プリント解答

〈三角関数〉

(1) $(\cos \theta, \sin \theta)$ は単位円周上の点

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = (\text{傾き})$$



(2) 角 = ±(弧の長さ), $180^\circ = \pi$

(3) $-1 \leq \cos \theta \leq 1, -1 \leq \sin \theta \leq 1$

(4) $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad \leftarrow x^2 + y^2 = 1 \text{ に代入}$


(5) $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \leftarrow \cos^2 \theta \text{ でわる}$

(6) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

(7) (C M 5)



(8) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$(9) \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}, \quad \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$$

$$(10) \sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$


$$\cos 3\alpha = -3 \cos \alpha + 4 \cos^3 \alpha$$

$$(11) \cos 2\theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin 2\theta = \frac{2t}{1 + t^2}$$

(12) $a \sin \theta + b \cos \theta$

$$= \sqrt{\left(\frac{a}{\cos \alpha}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sin \alpha}\right)^2} \sin(\theta + \alpha)$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$$



(13) 2乗は半角・積は2倍角

(14) ① $\cos \theta = x, \sin \theta = y$ とおくと, $x^2 + y^2 = 1$

② 与式を三角のいずれか1つで表し,

(その三角) = t とおく (変域に注)

③ $\sin \theta$ と $\cos \theta$ の対称式


(和) $\sin \theta + \cos \theta = t$ とおく

2乗して(積), 单振動の合成で t の(変域)


④ 2乗の和は $(\cos \theta, \sin \theta)$

2乗の差は $(1 / \cos \theta, \tan \theta)$

(15)(16)



(17)



(18) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

(19) $x = \cos \theta + i \sin \theta$ とおくと,

$$x^n = 1 \Leftrightarrow (\cos \theta + i \sin \theta)^n = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos n\theta + i \sin n\theta = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos n\theta = 1 \text{ and } \sin n\theta = 0$$

$$\Leftrightarrow n\theta = 2k\pi \quad (k: \text{整数})$$

$$\therefore x = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$$

ド・モアブル
の定理より

〈指數・対数関数〉

(20) $x^n = a$ の解 (n が偶数のときは $a \geq 0$ で, $\sqrt[n]{a}$ は正の解)

(21) $a^r = a \cdot a \cdot a \cdots \cdots \cdot a$ (n コの積)

$$a^0 = 1, a^{-1} = \frac{1}{a}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(22) $\Delta = \log_a ■ \leftrightarrow ■ = a^\Delta$ (真数 > 0 , 底 > 0)

(23) $\Delta = \log_a a^\Delta$


$$(24) \begin{array}{ll} ① a^x \cdot a^y = a^{x+y} & ② \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \\ ③ (a^x)^y = a^{xy} & ④ (ab)^x = a^x \cdot b^x \end{array}$$

$$(25) \begin{array}{l} ① \log_a x + \log_a y = \log_a xy \\ ② \log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y} \\ ③ r \log_a x = \log_a x^r \\ ④ \log_a ■ = \frac{\log_a ■}{\log_a a} \quad (\text{底変換公式}) \end{array}$$


$$(26) \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

(27) 対数を 1 つにまとめる方向で計算し, 結果として指数計算に持ち込む。

$$(28) y = a^x$$



$$(29) y = \log_a x$$



(30) 指數 ① $a^x = t$ とおく ($t > 0$)

② $a^x + a^{-x} = t$ とおく

(相加・相乗平均より $t \geq 2$)

対数 $\log_a x = t$ とおく

(31) ① (真数) > 0 , 底 > 0

② 底をそろえる

③ $\log_a \Delta \geq \log_a ■$ の形へ


④ $\Delta \geq ■$

check!

(注) (底) < 1 のときは不等号逆転

〈数列〉

(32) (C M11)



$$(33) a_{n+1} - a_n = d$$

$$(34) a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$(35) S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \quad (\text{たす順を逆にして } 2S_n \text{ をつくる})$$


$$(36) \frac{a_{n+1}}{a_n} = r \quad (\text{比が一定 } r)$$

$$(37) a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$(38) S_n = \begin{cases} \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} & (r \neq 1) \\ na_1 & (r=1) \end{cases} \quad \text{【ずらして、ひく】}$$

(39) 差, +, d , \sum , \times , \div , \cdot , r , \prod 入れかえできる

(40) [定義式 (基本となる n の入った式)]



求めるもの

$$(41) ① \sum c = nc \quad (c \text{ は定数})$$

$$② \sum k = \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$③ \sum k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$④ \sum k^3 = \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2$$

(42) $\sum k^b$ の公式は, $(k+1)^{b+1} - k^{b+1}$ の展開式を基本式として まないた をやる。

(43) —(a_k の形) —— (求め方) ——

- ① k の整式 → \sum 一公式の利用
 ② k が肩だけ → 等比の和の公式利用
 ③ k が肩やその他 → ずらしてひく
 ④ k の分数式 → 差に直してまないた

$$(44) \frac{\bullet \blacktriangle \cdots \blacksquare \star}{\bullet \blacktriangle \cdots \blacksquare} = C \left\{ \frac{1}{\bullet \cdots \blacksquare} - \frac{1}{\blacktriangle \cdots \star} \right\}$$

(注) $\sqrt{\quad}$ は有理化せよ 定数 C で修正

$$(45) a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$$

$$(46) a_1 = P_1, a_n = P_n / P_{n-1} (n \geq 2)$$

$$(47) a_{n+1} = r a_n + d \\ \rightarrow \frac{x}{(a_{n+1} - x)} = r \frac{x+d}{(a_n - x)} \quad \text{特性方程式をひくと等比}$$

$$(48) a_{n+1} = r a_n + f(n) \quad (\text{両辺を } r^{n+1} \text{ で割る})$$

① $f(n) = \blacksquare^*$ (n が肩にある)とき,両辺を \blacksquare^{n+1} で割る → (I型へ)② $f(n) = \blacktriangle n + \blacksquare$ (n の整式)のとき,

上にずらして、ひく → (I型へ)

$$(49) a_{n+1} = \frac{r a_n + s}{p a_n + q} \quad x = \frac{r x + s}{p x + q} \text{ の } 2 \text{ 解 } \alpha, \beta \text{ を}$$

求める

① $\alpha \neq \beta$ のとき $b_n = \frac{a_n - \beta}{a_n - \alpha}$ は等比② $\alpha = \beta$ のとき $b_n = \frac{1}{a_n - \alpha}$ は (I型・基本型)

$$(50) a_{n+2} = p a_{n+1} + q a_n$$

 $x^2 = p x + q$ の 2 解 α, β を求める → 与式は $(a_{n+2} - \alpha a_{n+1}) = \beta (a_{n+1} - \alpha a_n)$ と変形でき\{($a_{n+1} - \alpha a_n$)\} は等比, $\alpha = \beta$ のとき (II型) へ

$$(51) \begin{cases} x_{n+1} = a x_n + b y_n \\ y_{n+1} = c x_n + d y_n \end{cases} \quad (\text{連立型})$$

$$(x_{n+1} - \alpha y_{n+1}) = \beta (x_n - \alpha y_n)$$

をみたす α, β を求める → (等比)

(52) ① 各群に入っている項の数に注目

② 第何群の第何項目か、と問え

③ 各項の形に注目

$$(53) \frac{a}{9} (10^n - 1) \quad (\text{第 } n \text{ 項})$$

(54) (I) $P(1)$ を示す、(II) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ を示す、

(メモ)


$$\begin{array}{c} P(k) : \boxed{\text{hatched}} \stackrel{\cong}{\equiv} \boxed{\text{crossed}} \quad (\text{仮定}) \\ \uparrow \qquad \downarrow \\ P(k+1) : \boxed{\text{start}} \stackrel{\cong}{\equiv} \boxed{\text{stop}} \quad (\text{示す式}) \end{array}$$

(III) 以上より成立する。

毎日10分のCheck が合格への近道！

<微分法>

(55) (C M18)



(56) $x \neq a$ で、 x を限りなく a に近づけるとき、 $f(x)$ は限りなく b に近づく

(57) x に a を代入して、(分母) = 0 となるときはその原因 $(x-a)$ をなくせ！(√は有理化・約分)

$$(58) f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

(59) $y = f(x)$ の点 x における接線の傾き

$$(60) ① y = c \Rightarrow y' = 0$$

$$② y = x^a \Rightarrow y' = ax^{a-1}$$

$$③ y = af(x) + bg(x) \Rightarrow y' = af'(x) + bg'(x)$$

$$④ y = f(x) \cdot g(x) \Rightarrow y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$⑤ y = f(g(x)) \Rightarrow y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

(61) $y = f(x)$ の $x = a$ における接線の方程式は

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

(62) (定義) 接点を通り接線に垂直な直線

$y = f(x)$ の $x = a$ における法線の方程式は

$$-f'(a)(y - a) = x - a$$

(63) 定義域(x の変域)全体を通して増加(減少)のときは単調増加(単調減少)という。

(64) (極大値) = 増加から減少に変わる境目の y 座標

(極小値) = 減少から増加に変わる境目の y 座標

(65) グラフの凹凸(曲がり方)が変わる境目の点

$$\Rightarrow この点で f''(x) = 0$$

(66)

- ① 定義域(x の変域)・対称性を見る
- ↓
- ② $f'(x) = 0$ の実数解を求める
- ↓
- ③ 増減表をかく
- ↓
- ④ 極値を求める
- ↓
- ⑤ 他の点も求め、グラフをかく


(67) 3次関数のグラフは次の3種類のみ



(68) 4次関数のグラフは次の4種類のみ



(69)



(70)

方程式 $f(x) = g(x)$ が重解 $x = \alpha$ と実数解

$x = \beta$ をもつ

〈方程式の実数解〉

$\Leftrightarrow f(x) - g(x) = a(x - \alpha)^2(x - \beta) (\dots)$ と

因数分解できる

〈因数分解〉

\Leftrightarrow 2曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ が $x = \alpha$ で接し、


$x = \beta$ で交わる

〈グラフの共有点〉

(注) α は $f(x) - g(x)$ の最高次の係数

- (71) 不等式 $f(x) \geq g(x)$ が x のある変域で成立
 \Leftrightarrow 関数 $y = f(x) - g(x)$ のその変域における
 最小値が 0 以上
 \Leftrightarrow 関数 $y = f(x) - g(x)$ のグラフがその変域
 で x 軸より上にある

(72) (C M 24)



<積分法>

$$(73) \int f(x) dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

$$\int \Delta dx = \blacksquare + C$$

(積分) \nearrow
 \searrow (微分) \swarrow

$$(74) \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

(ただし, $F'(x) = f(x)$)

$$(75) \text{(面積)} = \int_a^b \text{(線分)} dx$$

$$\text{(体積)} = \int_a^b \text{(断面積)} dx$$

(76)

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx & (f(x) \text{ が偶関数}) \\ 0 & (f(x) \text{ が奇関数}) \end{cases}$$

(77) (計算の手順)


- ① $y =$ (絶対値の中だけ) のグラフの概形をかく.
 \downarrow
- ② 積分区間 $\boxed{\quad}$ をかき, 符号をつける.
 \downarrow
- ③ 各区間ごとに分割し, 絶対値のかわりに符号をつけて積分する.

$$(78) \frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) \cdot g'(x) \quad (a: \text{定数})$$

(79) (I) $f'(x)$ がある \Rightarrow 積分する(II) 次数がわかる $\Rightarrow f(x) = (\blacksquare \text{次式})$ とおく.(III) $\int_a^x \cdots$ (だけ) \Rightarrow 両辺を x で微分, $x=a$ を代入(IV) $\int_a^x \cdots + \frac{d}{dx} f(x) \Rightarrow f(x) = ax^n + \cdots$ とおく,
 n を決定(V) $\int_a^b \cdots$ がある $\Rightarrow \int_a^b (\Delta \text{だけ}) d\Delta = k$ とおく

(80)

$$\text{(面積)} S = \int_{\textcircled{④}}^{\textcircled{⑤}} (\textcircled{①} - \textcircled{②}) dx$$



毎日10分の努力が合格への近道！

(81)


① 交点を求める ②(82)

② グラフの概形をかく(メモ)

$$③ S = \int_a^b (\textcircled{1} - \textcircled{2}) dx$$


④ 積分の計算 < まじめに テクニック

(82) ① 交点 + 交点-Type




$$S = \frac{|a|}{6} (\beta - \alpha)^3$$

② 交点 + 接点-Type




$$S = \frac{|a|}{12} (\beta - \alpha)^4$$

③ 接点 + 接点-Type




$$S = \frac{|a|}{30} (\beta - \alpha)^5$$

④ 放物線と 2 接線



$$S = \frac{|a|}{12} (\beta - \alpha)^3$$

⑤ 2 放物線と 共通接線



$$S = \frac{|a|}{12} (\beta - \alpha)^3$$

(平行移動で重なる放物線)

$$(83) \int_a^b (x-\alpha)(x-\beta) dx = -\frac{1}{6} (\beta-\alpha)^3$$

(証明)

$$\int_a^b (x-\alpha)(x-\beta) dx$$

$$= \int_a^b (x-\alpha)(x-\alpha+\alpha-\beta) dx$$

$$= \int_a^b \{(x-\alpha)^2 - (\beta-\alpha)(x-\alpha)\} dx$$

$$= \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3} - (\beta-\alpha) \frac{(x-\alpha)^2}{2} \right]_a^b$$

(x-a)[▲]
の積分

$$= \frac{(\beta-\alpha)^3}{3} - \frac{(\beta-\alpha)^3}{2}$$

$$= -\frac{1}{6} (\beta-\alpha)^3$$

$$(84) \int_a^b (x-\alpha)^p (x-\beta)^q dx$$

$$= \frac{(-1)^q \cdot p! \cdot q!}{(p+q+1)!} (\beta-\alpha)^{p+q+1}$$


(85) 立体の体積

区間 (a, b) 内の任意の点 x で軸に垂直に切った断面の面積が $S(x)$ である右図の立体の体積 V は

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

(86)

基本型に分割



<物理量と微分・積分>

$$87) 1. v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad \alpha(t) = \frac{dv}{dt}$$

$$2. x(b) - x(a) = \int_a^b v(t) dt$$

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

