

数工最低限基礎事項 (基本プリント)

NO. 1.

〈論理的に考へたための記号〉

- (1) \Rightarrow の説明をせよ.
- (2) \Leftrightarrow の説明をせよ.
- (3) 背理法による証明とは.

〈数と式〉

- (4) 次の関係を図示せよ.
- (5) $x \in X$ (i) $X \subseteq Y$ (ii) $X \cup Y$
- (6) $X \cap Y$ (7) \bar{X} (or $U - X$)
- (8) N, Z, Q, R, C および $R[x]$ の名前と包含関係を図示せよ.
- (9) 集合 X が演算 α について閉じていふことは? また, 例を示せ.
- (10) べき乗 x^n の定義と性質を4つかけ.
- (11) 絶対値の定義をかけ.
- (12) 平方根 \sqrt{a} の定義をかけ.
- (13) 2重根号 $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \boxed{}$
- (14) $a, b \in R$ とする, $a+bi=0 \Leftrightarrow \boxed{}$
- (15) x の n 次の整式(多項式)とは?
- (16) 展開計算の基本は?
- (17) 因数分解の基本は?
- (18) 記憶すべき式とは?

$$\begin{array}{ll} (1) (a \pm b)^3 = & (2) a^3 = b^3 = \\ (3) (a+b+c)^2 = & \\ (4) a^4 + b^4 + c^4 - (ab + bc + ca) = & \\ (5) a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = & \\ (6) (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = & \end{array}$$

- (19) 式において, 1倍数・約数・公倍数・公约数・最小公倍数(L.C.M.)の定義は?

- (20) 互いに素とは, どういうことか?
- (21) 除法の原理をのべよ.

(19) 因数定理をのべよ.

(20) 分数式の計算のPointsは?

(21) 連比 $a:b:c = x:y:z$ の

定義と計算のテクニックは?

(22) P進法で $a_0 a_1 \dots a_n a_0(p)$ とは

10進法で $\boxed{}$ である.

(23) 対称式とは何が?

(24) 対称式についての定理は?

〈方程式と不等式〉

- (25) (1次) 方程式 $ax+b=0$ の解は? グラフは?
- (26) ① $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) の解の公式は?
② $ax^2+2bx+c=0$ ($a \neq 0$) の解の公式は?
- (27) 2次方程式の解の判別をかけ.
- (28) 2次方程式の解・係数・因数分解の関係をかけ.

- (29) (和)と(積)のわかるて32次は, 2次方程式 $\boxed{}$ の2解である.

(30) 高次方程式の解き方は?

(31) 相反方程式とその解法は?

(32) $x^3=1$ の解(1の3乗根)と性質は? (33) 未定係数法の原理をのべよ.

(34) 方程式とグラフの関係をのべよ. (35) 記憶すべき不等式(絶対不等式)

(36) $\begin{cases} ax+by=0 & \text{かつ } x-y=0 \text{ 以外の解} \\ cx+dy=0 & \text{をもつ必要十分条件は.} \end{cases}$

(37) 3次方程式の解・係数・因数分解

の関係をかけ.

(38) (和)と(積)のわかるて113

3次式は, 3次方程式 $\boxed{}$ の解である.

(39) 不等式の(-般的)解法は?

(40) 分数不等式の解法は?

(41) 無理不等式の解法は?

〈因数とグラフ〉

(42) 因数のグラフのかたわりをいえ.

(43) 1次因数 $y=ax+b$ のグラフは?

(44) 2次因数 $y=ax^2+bx+c$ のグラフは? 標準形をかけて示せ.

(45) $y=f(x)$ を x 軸を回して y 平行移動した因数は $\boxed{}$.

(46) 分数因数 $y=\frac{cx+d}{ax+b}$ ($a \neq 0$) の標準形は? グラフは?

(47) 無理因数 $y=\sqrt{ax+b}+c$ ($a \neq 0$)

のグラフは? グラフは?

(48) $y=f(x)$ の逆因数の求め方をいえ. また, 注意する点は何か?

(49) 合成因数とは?

(50) $y=x+\frac{1}{x}$, $y=x-\frac{1}{x}$ のグラフは? また, その応用は?

(51) (和)と(積)のわかるて32次は, 2次方程式 $\boxed{}$ の2解である.

(52) 絶対値のついで因数の扱いは?

〈式と証明〉

(53) 相反方程式とは何が?

(54) 倍数式とは何が?

(55) 未定係数法の原理をのべよ.

(56) 記憶すべき不等式(絶対不等式)

① 相加相乗平均

② シュワルツの不等式

③ 三角不等式

(57) 不等式の証明の方法は?

(58) 命題とは何が?


(59) $P \Rightarrow Q$ の逆・裏・対偶の回式をかけ.

(60) 必要・十分条件について説明せよ.

(61) " \sqrt{a} は無理数である" を証明せよ.

毎日10分の努力が合格への近道

<三角比>

(79) $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ といえ。

<MEMO>

(51) '四大帝+問題の4Point'で
だけ
(52) $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ の三角比を求める
(53) には、どんな直角△をかくか
(54) 三角関数の定義をいえ。
(55) $\sin(180^\circ - \theta) = \square, \cos(180^\circ - \theta) = \square$.
(56) $\sin(90^\circ \pm \theta) = \square, \cos(90^\circ \pm \theta) = \square$.
(57) $\tan\theta, \cos\theta, \sin\theta$ の関係は?
(58) $\cos\theta, \sin\theta$ の関係は?
(59) $\cos\theta, \tan\theta$ の関係は?
(60) 三角形に内接する四点をかけ.
(61) 正弦定理をかけ.
(62) 余弦定理をかけ.
(63) 三角形の形状決定問題の解法をいえ.
(64) 三角形の面積 S を求める式を4つかけ.

<平面图形と式>

以下では、 $A(z_1, y_1), B(z_2, y_2), C(z_3, y_3)$ とする。(61) 2点 A, B の距離は、 $AB = \boxed{}$.(62) 線分 AB を $m:n$ に分割する点 P の座標は? (内分、外分)(63) 線分 AB の中点 M は?(64) $\triangle ABC$ の重心 G は?

(65) 直線の方程式の一般形をかけ.

(66) 点 $A(z_1, y_1)$ を通り、傾き m の直線は?(67) 2直線 $y = mx + n, y = m'x + n'$ の関係を

求めよ.

(68) 点 $A(z_1, y_1)$ から直線 $az + by + c = 0$ に下して垂線の長さ(距離) d は?(69) $\triangle ABC$ の面積は?

(70) 円の方程式の一般形をかけ.

(71) 中心 (a, b) 、半径 r の円の方程式は?(72) (71) の円上の点 (x_1, y_1) における接線の

方程式をかけ.

(73) 円の接線の性質を2つかけ.

(74) 2曲線 $f(x, y) = 0, g(x, y) = 0$ について、① 2曲線が共有点をもつ \Leftrightarrow ② 2曲線が接する \Leftrightarrow

③ 2曲線の交点を通る曲線(群)の

方程式をかけ.

(75) 曲線 $f(x, y) = 0$ を x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動した曲線は?

(76) 極座標表示とは?

(77) 軌跡の求め方は?

(78) 不等式の最も領域の図示の仕方は?

(79) $(y-x^2)(x^2+y^2-1) \geq 0$ の表す

領域を図示せよ.

やむを得ない。毎日10分
くり返しやろう!

数I 基本アリトの解答

(ノート)

〈論理的に考えるための記号〉

(1) $P \Rightarrow Q$ (P なら Q) とは、

P を仮定すれば Q が導かれること

④ \Rightarrow ⑤

(2) $P \Leftrightarrow Q$ (P, Q は同値、必要十分)


とは、 P と Q は論理的かつか同じ内容

であることを表す。 $P \Rightarrow Q$ かつ $Q \Rightarrow P$

(3) $P \Rightarrow Q$ を証明する方法:

P かつ $not Q$ を仮定して矛盾を導く

〈数と式〉



X は Y の要素



X は Y の部分集合



和集合



共通部分



$X \cup Y$



(6) 任意の $x, y \in X$ たゞ $x, y \in X$.

(7) Z は $+, -, \times$; Q, R, C は四則;

$R[x]$ は $+, -, \times$ について閉じている。

(8) $x^n = x \cdot x \cdots x$ (nの積)

$$\textcircled{1} x^m \cdot x^n = x^{m+n} \quad \textcircled{2} \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (x^m)^n = x^{mn} \quad \textcircled{4} x^m \cdot y^n = (xy)^n$$

$$(9) |x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

(10) $x^2 = a$ の解を $\pm\sqrt{a}$ とかく。

(11) $a \geq 0$ のとき、 \sqrt{a} は正の実数

② $a < 0$ のとき、 $\sqrt{a} = \sqrt{-1}i$ 虚数

$$(10) \sqrt{a+2\sqrt{b}} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$$

$$\left(\begin{array}{l} x, y \text{ は } (x+y)^2 = a \\ (x-y)^2 = b \end{array} \right) \text{ と } \left\{ \begin{array}{l} x+y = \sqrt{a} \\ x-y = \sqrt{b} \end{array} \right.$$

$$(11) a+bi = 0 \Leftrightarrow a=b=0$$

$$(12) a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_nx + a_n \quad (a_0 \neq 0) \text{ など形の式}$$

(13) 同次数項ごとに計算する。

(14) ① 共通因数をくり出し。

② 最低次数の1文字についてせいり。(3次以上の場合)

③ 因数定理の利用

④ まとまり = もとあく。 (置換)

⑤ (4次) 2乗の差をつくる。

$$(19) x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$$

$$(15) ① (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3ab^2 + 3a^2b \pm b^3$$

$$② a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$③ a^3 + b^3 + c^3 + 2(ab + bc + ca)$$

$$④ \frac{1}{2}((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2)$$

$$⑤ (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

$$⑥ (ax + by)^2 + (ay - bx)^2$$

$$(16) P(x) = A(x)Q(x) \text{ など}, P(x) \text{ は}$$

$A(x)$ の倍数, $A(0)$ は $P(x)$ の約数。

2つ以上の整式に共通の倍数(約

数)を公倍数(公約数)といい,

その内次数の最小(最大)のものを

最小公倍数(最大公約数)といい。

(17) 2つの整式で1次以上の公約数

がないものを互いに素といい。

(18) 整式において,

$P(x) \in A(x)$ で割り切れる, 商 $Q(x)$, 余り $R(x)$

$$\Leftrightarrow P(x) = A(x)Q(x) + R(x)$$

$(R(x))$ の次数 $\leq (A(x))$ の次数

(19) ① $A(x) = 0$ の解を代入する。

② 重解のときは $待分の利用$

(20) ① $f(x) = 0$ (i.e. x は $f(x) = 0$ の解)

$\Leftrightarrow f(x) = (x-a)g(x)$ と因数分解で \exists .

(21) ① (分子の次数) \leq (分母の次数) でよ。

② 部分分数に分けよ。 $\frac{(x-\frac{a}{k})}{(i-\frac{a}{k})} \times x$

(22) $a:b:c = x:y:z$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = t \text{ とおく (置換)}$$

(23) どんな2文字の入力がしても変化し

ない式。(例. $x^2 + y^2, a^2 + b^2 + c^2$)

(24) 対称式は基本対称式で表せる。

基本対称式 (3文字) 和 $x+y+z$

(2文字) 和 $x+y$ 様の和 $xz+yz+zx$

積 xz 積 xyz

〈方程式と不等式〉

(25) $a \neq 0$ (唯一解)

$\textcircled{1} ax+b=0$ $a=0$ $b=0$ (不定解)

$a \neq 0$ $b \neq 0$ (無解)

$$(26) \textcircled{1} x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, D = b^2 - 4ac$$

$$\textcircled{2} x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{a}, D = b^2 - 4c$$

(27) 相異なる2実数解 $\Leftrightarrow D > 0$

重複実数解 $\Leftrightarrow D = 0$

共役な2虚数解 $\Leftrightarrow D < 0$

(28) 実数解 $\Leftrightarrow D \geq 0$

(29) $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ の解 α, β

$\Leftrightarrow ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)(x-\beta)$ と因数分解で \exists .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases} \text{ (解と係数の関係)}$$

$$(30) \textcircled{1} t^2 - (和)t + (積) = 0$$

(31) ① 因数定理の利用

② まとまり = もとあく。 (置換)

$$(31) \alpha z^3 + bz^2 + cz + d = 0 \quad (\alpha \neq 0)$$

← 左右対称の1次式

解法 $z=0$ を明記し, $z+\frac{1}{z}=t$ とおく。(32) 1の3重根は, $1, \omega, \omega^2$

(注質) ① $\omega^3 = 1$ ② $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

(33) 方程式 $f(z)=0$ の実数解(重複解)は $y=f(z)$ のグラフと z 軸($y=0$)との交点。(接点) の z 座標である。(34) ①(両辺) ≥ 0 のとき、両辺2乗

②(\int の中) ≥ 0 , (\int 前の) ≥ 0 に \oplus

(35) <未知数(文字)の数> - <式の数> に

注意して、1文字消去

(36) $ad - bc = 0$ (④ $\square x = 0 \neq z \neq 0$ は

3角形をもつ $\Leftrightarrow \square = 0$)

(37) $\alpha z^3 + bz^2 + cz + d = 0$ ($\alpha \neq 0$) の α, b, c, r

\Leftrightarrow \alpha z^3 + bz^2 + cz + d = \alpha(z-\alpha)(z-\beta)(z-\gamma)

と因数分解して.

\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{\alpha} \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{\alpha} \\ \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{\alpha} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(解と係数)} \\ \text{の関係} \end{matrix}

(38) $t^2 - (\text{和})t^2 + (\text{積})t - (\text{積}) = 0$

(39) 5不等式を(因数分解式)をも

と変形し、次の規則で $y=(\text{左辺})$ のグラフを

- かく。
 ① 最高次の係数 $\neq 0$ とする。
 ② $()$ は消し、 $()$ はまわす。

(40) $(\text{左辺})^2$ を両辺にかけ、 $(\text{左辺}) \neq 0$ を付加。

(41) 極理式を不等号の一方の辺に令記

して、 $y=(\text{左辶})$ と $y=(\text{右辶})$ のグラフをかく。(42) 不等式 $f(z) \geq 0$ の解は、 $y=f(z)$ のグラフが z 軸($y=0$)以上にあり得る

2の範囲でみる。

(39) $(\text{左辶}) \quad (z+1)^2 z^2 (z-2) \geq 0$ を解け！
 $\geq (z+1)^2 z^2 (z-2)$
 ≥ 0

$\frac{1}{z+1} \geq 0 \quad z \neq -1$
 $\frac{1}{z} \geq 0 \quad z \neq 0$
 $z-2 \geq 0 \quad z \neq 2$

<商数とグラフ>

(40) グラフの極点を覚えておく、適当な点をとてかく。

<極とa, bの直線>

(41) $y = a(z + \frac{b}{2a})^2 + \frac{D}{4a}$, 且 $z = -\frac{b}{2a}$

頂点 $(-\frac{b}{2a}, \frac{D}{4a})$ の おさげを表す

(a>0) は下凸, a<0> は上凸)

(42) $y - g = f(z-p)$ $\begin{cases} \text{左辶} & \text{右辶} \\ \text{左辶} & \text{右辶} \end{cases}$


(43) $y = \frac{k}{z-p} + g$ 直角双曲線

漸近線 $z=p, y=g$

<双曲線の半分の種をかく>

(44) ① x, y を入れ替える(変域③)② y に x を入れ替へ $(y=\text{左辶})$

(45) $y = f(g(x)) \Leftrightarrow \begin{cases} y = f(z) \\ z = g(x) \end{cases}$



(46) $y = z + \frac{1}{z}$ $y = z - \frac{1}{z}$

(応用) $z + \frac{1}{z} = t$ と置換する。tの変域は $\begin{cases} z > 0 \Rightarrow z > t > 2 \\ z < 0 \Rightarrow z < t < -2 \end{cases}$ (47) (A) 全体に $|z| > 1$ か $|z| < 1$ とする。 $y = |f(z)|$ のグラフは、 $y = f(z)$ のグラフ $z \cdot y < 0$ の部分と z 軸に沿って折り返して $z^2 > 1$ 。(48) 部分的に $|z| > 1$ または $|z| < 1$ とする。

1・1の定義により場合分けする。

(49) $(\text{左辶}) = \text{整数}$ に変形し、

(50) 特殊解をいじめて代入した

式を与式からいく。

<式と証明>

(51) 等式 $f(z) = g(z)$ が z の恒等式⇒ 任意の z に対して等式が成立 $(f(z) = g(z) \text{ とかく。})$ (52) $f(z), g(z)$ で z 以下の整式とす。
 $f(z) \equiv g(z)$ ⇒ 相異な3 ($n+1$) の z の値に対して
 $f(z) = g(z)$ が成立。⇒ $f(z), g(z)$ の各次数の係数が
 すべて等しい。(53) ① $a > 0, b > 0, c > 0$ とき、

$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (等号条件 $a=b$)

$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ (等号条件 $a=b=c$)

② $(a+b)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$

(等号条件 $a:b:x:y = 1:1:1:1$)

$(a^2+b^2+C^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$

(等号条件 $a:b:c = x:y:z$)

③ $||x|-|y|| \leq |x+y| \leq |x|+|y|$

(等号条件: (左辶) $x \geq 0$, (右辶) $x \leq 0$)(54) ① (左辶)-(右辶) ≥ 0 を示す。② (左辶) ≥ 0 なので、(左辶) 2 -(右辶) 2 ≥ 0 を示す。

③ (外)の絶対不等式を利用する。

④ グラフをかいて調べる。 **重要**

(55) 真・偽の定まるている文(主張)

(56) $P \Rightarrow Q$ 逆 $Q \Rightarrow P$ 裏 $\neg P \Rightarrow \neg Q$ $\neg Q \Rightarrow \neg P$ $\neg P \Rightarrow \neg Q$ $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (57) $P \Leftrightarrow Q$ が成立するとき、 $\begin{cases} P \text{ は } Q \text{ のための十分条件} \\ Q \text{ は } P \text{ のための必要条件} \end{cases}$ といふ。(58) $P \Leftrightarrow Q$ が成立するとき、

P, Q は必要十分条件であるといふ。

(59) $\sqrt{A} = \frac{1}{P}$ (既約分数) かつ、方程

(P, Q は公約数をもつ) を書く。

〈平面图形と式〉

$$(61) AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$(62) P\left(\frac{nx_1 + ny_1}{m+n}, \frac{mx_1 + ny_2}{m+n}\right)$$

(mn>0-内分, mn<0-外分)

$$(63) M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

$$(64) G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

$$(65) ax+by+c=0 \quad (a \neq 0 \text{ or } b \neq 0)$$

$$(66) y-y_1 = m(x-x_1)$$

$$(67) ① \perp \text{致る} \Leftrightarrow m=m', n=n'$$

$$② \text{重なる} \parallel \Leftrightarrow m=m', n \neq n'$$

$$③ \text{直交する} \Leftrightarrow m \cdot m' = -1$$

$$④ \text{交わる} \Leftrightarrow m \neq m'$$

$$(68) d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$(69) S = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1|$$

$$(70) x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

$$(71) (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$$(72) (x_1-a)(x_2-a) + (y_1-b)(y_2-b) = r^2$$

$$① CH \perp \text{接線} \quad ② \overline{CH} = \text{半径 } r$$



$$(74) ① \text{連立して得る2次方程式の } D \geq 0$$

2円の場合は因数を2つ、中心間の距離と半径の和差の関係を利用。

$$② 接点にて、接半径を共有する \Leftrightarrow D=0$$

$$③ f(x, y) + g(x, y) = 0 \quad (\lambda: \text{定数})$$

$$(75) f(x-p, y-q) = 0$$

(76) 曲線の方程式を、tを媒介と
して、 $x=f(t), y=g(t)$ (t の意味)
と表す。

(77) 軟足と5つの象限を (X, Y) と

おき、条件より $X, Y \in \mathbb{R}$ の関係式を示せ。
ただし、(原点のとき)

(78) ① 不等式を符号にして、境界線を

かく。(含むか否かを明示せよ)

② 境界を基で正切られた各部分内の
適當な1点を代入して成立する時は、そ
の部分を斜線でぬる。



$$(79) y \geq f(x) \Leftrightarrow$$

(原点の上側)

境界を基は


$$\begin{cases} y = x^2 & \text{--- ①} \\ x^2 + y^2 = 1 & \text{--- ②} \end{cases}$$

(①, ②を含む)




$$(80) \sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$



$$(81) \sin(90^\circ \pm \theta) = \cos \theta$$



$$(82) \cos(90^\circ \pm \theta) = \mp \sin \theta$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$(83) (85) \text{の两边を } \cos^2 \theta \text{ で割り, } 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$(84) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$(85) \text{正弦定理} - \sin \theta = \frac{r}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{r}{\sqrt{1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}}} = \frac{r \cos \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}} = \frac{r \cos \theta}{1} = r \cos \theta$$

(86)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$(87) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

(88) (87) を用いて、边a, b, cの周
長式を導く。

$$(89) \text{直角 } \Delta \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2 \text{ etc}$$

$$(90) S = \frac{1}{2} ab \sin C \quad (-\frac{1}{2} \Delta a \sin B)$$

$$S = \frac{abc}{4R} \quad (\text{外接円})$$

$$S = pr \quad (\text{内接円})$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

八角の式